

MEDIDAS DE CONTROLO DA AUTO-MUTILAÇÃO EM PAPAGAIOS

- ✓ Reduzir a ingestão de alimentos ricos em gordura, ou seja, de sementes. Deve proceder-se a conversão da ave para uma dieta à base de ração formulada, suplementada com fruta e vegetais;
- ✓ Proporcionar acesso regular a radiação ultravioleta (UV-b), que pode ser natural (luz solar direta, sem interposição de vidro nem plástico) ou artificial (lâmpada emissora comercializada para aves). A radiação UV-b favorece a saúde da pele e é essencial para a produção de vitamina D. Além disso, as aves conseguem ver estes comprimentos de onda, o que estimula um comportamento natural;
- ✓ Garantir que a ave não está exposta à luz durante mais de 12 horas por dia;
- ✓ Evitar a exposição a qualquer tipo de fumos e vapores, como sejam o fumo de tabaco, vapores emitidos pelo aquecimento de material de cozinha antiaderente e ambientadores;
- ✓ Proporcionar um banho ou borrifar a ave **diariamente** com água tépida;
- ✓ Melhorar a socialização da ave com vários proprietários e considerar o treino regular da ave, como método de estimulação intelectual;
- ✓ **Nunca** proceder a corte das penas de voo;
- ✓ Lavar **sempre** as mãos antes de manipular a ave;
- ✓ **ACIMA DE TUDO: IGNORAR SISTEMATICAMENTE O COMPORTAMENTO AUTODESTRUIDOR E RECOMPENSAR O COMPORTAMENTO INDEPENDENTE. ©**